

壽世青編

壽世所編卷下

古平江尤乘生洲手纂

○服藥須知

夫病之所由來。因放逸其心。逆於生樂。以精神。徇智巧。以憂慮。徇得失。以勞苦。徇禮節。以身世。徇財利。四徇不置。心爲之病也。極力勞形。躁暴氣逆。當風飲酒。食嗜辛鹹。肝爲之病矣。飲食失節。溫涼失度。久坐久臥。大飽大飢。脾爲之病矣。呼叫過常。辨具陪答。冒犯寒暄。恣食酸鹹。肺爲之病矣。久坐濕地。強力涉遠。縱飲芳形。三田漏益。腎爲之病矣。五病既作。故未老而羸。未羸而病。病至則重。重則必斃。嗚呼。是皆弗思而自取之也。今旣病矣。

而後藥之得非。溫掘井子然必以慎起居戒暴怒簡言語清
心寡營。輕得失。視所節飲食。忌肥濃炙煇生冷。凡食勿頓而
多。任可少而頻。食不欲急急。則傷脾。法官細嚼緩燕。勿太熱。勿
太冷。又不得雜雜。則物性或有相反。則脾與胃不大可慮哉。苟
能慎之。服藥自效。設仍率性。任性。不守戒忌。豈特藥力無功。而
其疾更劇矣。是不可不慎。

○煎藥有法

一慎用水。按方書所載。

長流水。

卽十里水。但當取其流長而來足其不可泥十里
之外者。以取其來遠。連連用。以前煎治手足困厥病反
連利二便
之藥也。

急流水

瀉上收急之流之也以其急速而達下

順流水

其性順而下流故亦收治下

逆流水

慢流澗澗之水也以其逆而回

半天河水

即長桑君授扁鵲飲以上池之水乃內餘潘頭管

氣故可以煉還丹調仙藥之用

春雨水

立春日空中以器盛接之水其性始得春井生發之

萬物之意耳

秋露水

其性稟收斂肅殺之氣取煎祛崇

井華水

清最井中第一汲者其天一真元之氣浮

新汲水

井中新汲水人缸甕者取其無所混濁川以前藥為潔

甘瀾水

以器盛水足以器湯濯之使其珠沫益干水而約以百次為度取其性變溫柔能理傷寒陰症

潦水

即無根水由各中無人處新坎中水也取其性止而不流且有上氣清者三煎調脾胃補中氣之劑

冬霜水

陰盛則露結為霜霜能殺物性隨時異也解酒毒治熱病收霜法雞羽刷許漚密封候用 二方治藥

執檐枝霜一不執酒送下音効如神

臘水

冬至后第三戌為瀉其水解時皮丹石膏煎其者溺止清湯洗目亦如神及調和殺重藥用

陰陽水

即生熟水新汲水合百沸湯和勻是也人燒鹽飲之消解飽過度霍亂肚脹者飲一二升吐出痰食即痊

凡霍亂嘔吐不能合細食其勢危者先飲數口即定

菊英水

蜀中有長壽源其源多菊花而流水皆菊花香居人飲其水者壽皆二三百歲故謂之好種菊花日采其

花英浸水烹茶期延年也夫本草雖有請水之名而不及其用今特表而出之

按千金方去煎人參須用流水用止水即不驗今甚有宿水
煎藥不惟無功恐有礙陰氣所侵益蒙其害即湯湯停宿
者。浴面無顏色洗身成癬已上諸水各有所宜臨用之際宜
細擇焉

慎火候按方書所載

桑柴火

桑木能利關節養津液得火則良抱朴子云一切仙藥不得桑煎不服桑乃其星之精能助藥力除風濕

痺痛久服經身不患風疾故也

燥炭火

宜煖煉一切金石之藥以其堅也

金粟火

即粟米炭也燥煉丹藥用

輝炭火

宜煎焙炙百藥丸散

白炭

誤吞金銀銅鐵在腹燒紅急為未煎湯呷之甚奇刮末三錢并水調服未効再服又解水銀砒石毒

石炭

今西北所產之煤即見
不入藥用

麝荻火竹火

宜煎一切
虛弱藥

按火有文武從容和緩不疾不徐文火也恐熾煩沸騰則藥
汁易涸氣味不全耳并用紙蘸水封器口煎之如煎探吐痰
飲之劑當用武火取其急速而發吐之也

二煇煎器必用砂鉢瓦罐如富貴家津銀之器煎之更妙切忌
油穢腥氣銅錫鐵鍋或煎過他藥者必滌淨器目用紙蘸
水封之

一煇煎藥之人有等營莽者不設水火事宜煎熬或藥汁太多
而背地傾瀉或過煎太少而私天茶水供應病人惟圖了事

必擇誠慎記識人候者或親信骨肉按法煎造其去宜必用
新絹漚淨取清汁服

慎服藥凡病在胸膈以上者先食而後藥病在心腹以下者
先藥而後食病在四肢血脈者宜先食而仕且病在骨髓者
宜飽食而在夜在上不厭頻而少在下不厭頻而多少服則
滋潤於上多服則峻補於下其藥氣與食氣不欲相逢食氣
下則服藥藥氣退則進食有食前食後服宜審此意

○服藥忌食

凡服藥不可雜食肥膩魚酢陳羹大菜諸肉及胡荽生薑蒜韭
生菜瓜果生冷滑滯之物并忌見死屍虛婦淫穢等事

有蒼白水

心恍惚李龍肉
青魚蛇松茸

有黃連胡

黃連水並忌

有甘草

肉海菜
慈果

有桔梗遠志烏梅

水忌不肉治

有地黃何首烏

切血莖
蒜菜服

有半夏自蒲補骨脂

忌一切藥
忌下肉

有細辛常山

煮

有丹參茯苓

忌一切藥
米切藥

有牡丹皮

忌胡
有仙

茅牛膽

忌牛乳
有蒼耳

有吳茱萸

忌不心肺
有

荆芥

忌河豚
有二人

有鱖魚

忌魚
有澤瀉

忌海

有枸杞草薺

忌牛乳
有

有肉桂蜂窠

忌
有厚朴草

麻豆

有巴豆

有薄荷

有紫蘇丹砂龍骨

忌鯉

有商陸

有當歸

有附子烏頭天雄

料稷

有王茯苓威靈仙

忌茶
有雲母鍾乳暴石硫磺

○飲食禁忌節要不可同食

食猪肉忌猪猪肝忌猪猪心忌猪肺忌猪羊忌羊羊肉忌羊子忌羊羊心忌羊肝忌羊肺忌羊

大肉忌猪牛肉忌猪牛肝忌猪牛乳忌猪牛同忌猪雞肉忌猪雞子忌猪同忌猪蒜忌猪

鴨子忌李鴨鵝忌李耳忌李雀肉忌李醬忌李鯉魚忌李鯉魚忌李鯉魚忌李鯉魚忌李鯉魚忌李

魚鮮忌李黃魚忌李鱸魚忌李鯉魚忌李鯉魚忌李鯉魚忌李鯉魚忌李鯉魚忌李鯉魚忌李

李子忌李棗忌李棗忌李棗忌李棗忌李棗忌李棗忌李棗忌李棗忌李棗忌李

楊梅忌李蕎麥忌李蕎麥忌李蕎麥忌李蕎麥忌李蕎麥忌李蕎麥忌李蕎麥忌李蕎麥忌李蕎麥忌李

口病有十失

驕恣率性不遵戒忌一也輕命重財治瘡不早二也聽信

巫疇廣行殺戮不信醫藥三也諱疾訛醫言不出中四也

不善擇醫信人毀譽或從耆卜[五]也 急欲速效且慕更張雜
劑亂投[六]也 索即寫方製炮未宜私旨加減[七]也 侍奉不
得人則丸失法意不詳[八]也 寒與不適飲食無度[九]也
過服湯藥傷滌腸胃[十]也

○病有八不治

一 室家乖戾處事不和動成荆棘[一]也 恣縱悖淫不自珍重[二]
也 憂思鬱結失榮懷[三]也 今 預愁明日一年營計百
年[四]也 煩躁暴戾不自寬慰[五]也 窘苦拘囚無漸灑志[六]
也 怨天尤人廣生懊惱[七]也 以 爲苦難割難捨[八]也
却病十要

一、要靜坐觀空萬緣放下當知
大原從假合勿認此身爲久
去長住之所戰戰以爲憂也

二、要煩惱現前以死喻之勿以平昔較短

三、要常將不如我者巧自寬解勿以不適生嗔

四、要造物勞我以生遇病却問反生嗔幸

五、要深信因果或者夙業難逃却歡喜領受勿生嗔怨

六、要至家和睦無交謫之言入耳

七、要起居務適毋強飲食寧節毋多

八、要嚴防嗜欲攻心風露侵衣

九、要常自觀察克治病之根本處

口病有七失不可治

疾病有七失不可治者失於不聞失於不問失於不慮失於不
忽過時失於不擇醫失於不辨藥失於自立意見應補責過以
瀉畏攻責醫欲補慙針欲艾應灼欲砭七者之中自一於此卽
爲難治非止醫家之罪實病家之自誤也別有醫不慈仁病者
情鄙一理交馳於病爲害者不少由是言之醫者不可不慈仁
病者不可多情鄙如犯之則招禍在醫者當以救濟爲心在病
家務以精誠篤摯爲念名器其極乃治病家之大端也

○老人病不同治法

常見年高疾患將同少年。擬投湯藥。及行針灸。務得速愈。殊不知年老之人。血氣已衰。精神減耗。至于視聽不至。聰明手足舉動不隨其志。身體勞倦。頭目昏眩。宿疾時發。或秘或泄。或冷或熱。皆老人之常也。勿緊用針藥。急求痊愈。往往因此別致危殆。且攻病之藥。或汗或吐。或解或利。緣衰老之人。不同年少。少者直氣壯。氣雖汗吐轉利。未至危殆。其老弱者。汗之則陽氣泄。吐之則胃氣逆。下之則元氣脫。立致不可救。此養老之大忌也。大率老人藥餌。止用扶持。只可溫平順氣。進食補虛。中和之劑。不可用市肆購買。他人惠送。未識方味者。與之服餌。切須詳審。

若有宿疾時發則隨其疾狀用和平湯劑調順三朝五日自然
痊愈惟是調停飲食隨其食性變饌治之此最爲良法也

口治婦人有不能盡注之弊

治婦人疾有不能盡聖人之法者今官貴之家居與室之中處
睡輒之內甚又以口授手臂既不能行望色之神又不能確切
脈之巧四者有一缺焉費帛曰凡治病察其形氣色澤形氣相
得謂之可治色澤以得謂之易治形氣相失謂之難治色天不
澤謂之難色又曰診病之道觀人形氣骨肉皮膚能知其情以
爲診法者病人脈病不相應既不得見其形脈者止據脈供藥
其可得乎如此言之爲能盡其術哉此醫家之公患世不能

醫者不得不盡理。問以類。謂一病家見其所問。頗經意。其
道不精。往往得藥不服。似此甚多。扁鵲見齊侯之色。尚不肯信。
況其不得見者乎。嗟哉。

○妄庸議病

世有病人親朋故舊。交游來問疾者。其人曾不經一事。未讀一
方。自誇了了。談說異端。或言是虛。或言是實。或云是風。或云是
氣。紛紛謬說。種種不同。使亂病人心。意不知孰是。遷延已久。時
不待人歎然。致禍各自走散。設有明醫識病。深探究方。書數
知本草。看病不真。大悞人事。何況妄議者乎。

○古方無妄用

鄱陽周順賢有十全之功云古方如聖惠千金外臺秘要所論
病原脈症及針灸法皆不可廢然處方分劑與今大異不深究
其旨者謹勿妄用有人得目疾用古方治之目遂突出又有婦
人因產病用外臺秘要坐導方其後反得惡露之疾終身不差
曾有士人得脚弱病方書羅列積藥如山而疾益甚余令悉屏
去但用杉木爲桶盛水濯足并令排樟腦於兩股間以脚襯
墊定月餘而安穩如初南方多此疾不可不知順因名醫語必不
妄故錄于此

○草藥不可妄用

用志云紹興十九年三月興州僧希賜往州南三十里洗口嶺

時有客曰。自蜀至。舟中士人。偶一疾。病脚弱不能行。舟師憫之。曰。吾有一藥。治此病如神。餌之而差者。不可勝計。既賽廟畢。飲酢頗醉。乃入山求得草。漬酒。投病者。令今天未明服之。如其言。藥入口。卽呻吟云。腸胃如刀割。截痛遲明而死。士人以咎舟師。舟師悲曰。何有此。卽取昨夕所餘藥。自漬酒服之。不踰時亦死。蓋此山多斷腸草。人誤食之輒死。舟師所取藥。爲根蔓所纏。卽不暇擇徑投酒中。以此致禍。則知草藥不可妄用也。

○真菊野菊

蜀人多種菊。以苗可以菜。花可以藥。園圃悉能植之。今人多採野菊供藥肆。頗有大誤。真菊延齡野菊。殺人如張華言黃精益。

壽鉤吻殺人形類相似之誤有如此

○服餌忌羊血

服餌之家忌食羊血。雖服餌數十年。一食則前功盡喪。以其能解藥力如此。

○論婦人病有不同治法

孫真人云。寧醫十男子。莫醫一婦人。以嗜欲多於丈夫。故感病倍於男子。蓋其慈戀愛情。嫉妬憂患。染著堅牢。情不自抑。以此成疾。非外感六氣。必內傷七情之所致也。七情之病。不可醫。誠以情想為結。自無而有。思慮過。萬多致。然損是以釋氏。搦說。醉等。山想。路懸。是心酸。是大。知如此。非。竟。情。意。改。

易心志則雖金丹大藥亦不能已。蓋病出於五內無有已期。藥力不可及也。法當令病者存想以攝心。如情以養性。

葛仙翁曰。凡婦人病兼治其意。惡今真其思。庸則疾無不愈矣。凡人在病中百念灰冷。雖有貴欲。享不能反。美貧賤而健者。人能于平日無病時。作是想。病從何來。及一切名利得失。恩怨亦自淡然。

○用藥例。丸散湯膏各有所宜。

藥有宜丸。宜散者。宜水煎者。宜酒漬者。宜煎膏者。亦有一物兼宜者。亦有不可入湯酒者。並開藥性不可過恐。湯者。湯也。煎成清汁是也。去火病用之。散者。散也。研成細末是也。丸者。緩也。作

成丸粒也不能速效舒緩而治之也。漬之者以酒浸藥也有宜酒浸以助其力如常歸地黃知母黃柏陰寒之氣味假酒力而行氣血也有用藥判細如法煮酒密封早晚頻飲以行經絡或補或攻漸以取效是也。

細末者不循經絡止去胃中乃府藏之積及治肺疾欬嗽爲宜。氣味厚者白湯調氣味薄者煎之。和查服丸治下焦之病者極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小。麤糊者取其遲化直至下焦或酒取其散醋取其凝薑汁稀糊丸取其易化也。湯煎者取其遲化而氣循經絡也。蠟丸者取之不能達下焦而治腸胃等疾。

修心丸。用蜜。祇用蜜。祇用蜜。勿相雜。用。且如丸藥。用
蟻。取其別。養氣。欲其經久。不失味力。且過腸。開而作効也。今
若投蜜相和。雖易爲丸。然下咽。亦卽散化。如何得致腸中。若或
有毒藥。不宜在上化。豈徒無益。而反爲害。全非用蟻之本意。
凡藥。宜先涼去沫。令藥色微黃。試水不散。再熬一二沸。作丸
則散。而不粘成塊也。

冬月煉蜜。煉時。要加二杯水爲妙。衍義云。每蜜一觔。祇煉得十
二兩。是其度數也。和藥末。要乘極滾時。和之。臼內搗千百。將自
然。乾乾。易作條好丸也。

凡爲末。先須細切。曬燥。退冷。搗之。有宜合搗者。有宜各搗者。其

滋潤之藥如天麥冬生熟地黃當歸等皆宜切曬之獨搗或以
慢火隔紙焙燥。退火搗之則為細末。若入衆藥少待回潤則和
之。不白也。凡湯藥燒皆大耗氣。當先將分兩待燥和之。乃准其
湯酒中不須如此。

凡合丸藥用密絹合細篩散藥尤宜精細。若搗丸必於石臼中
杵千百遍色齊和同為佳。

凡欲浸酒皆須細切上絹袋盛。乃入酒密封。隨聚暑日數視其
濃烈便可漉出。不須待酒盡也。在則暴燥微熾更漬飲之亦可
為散服。

凡合膏子須令膏少之料先淹浸。先煎其汁。以下有膏之料熬

時當杖以三上三下以泄其火氣。勿令沸騰。不妨旋取藥汁。直須再煮。務令力盡而已。然後漸漸慢火收。如餘加煉。密收貯磁瓶。出火氣。七日。聽用。

凡煎膠貼之膏。或藥酒。或油。須令淹浸。然後煎。用杖三上三下。以泄其熱。今藥味得出。上之使極。極下之。要湯靜良久。乃上之。如有葱白及薑石內。以漸煎。煎度。如有附子木藟者。亦令佳。黃芩令枯。男婦通皆。必以新布。若是可服之膏。藥亦可酒煎飲之。可壓之膏。查亦可敷。亦欲兼盡其藥力也。

凡湯中用諸石藥。皆細研之。以新絹袋之。細中。衍義云。石藥入散。如硃砂。鍾乳之類。用水研乳。極細。必要二三日。乃已。以水

藥性論云可服餌豈但研細絹裹爲是

凡草葉之藥。如栝實。荷葉。茅根。薊根。灰散類。必要佳栝。用器蓋在地上。出火性。存木性。倘如死灰。則白無効矣。

凡有脂膏。如桃杏。麻仁等。須另末。旋次入衆味。合研則勻。凡湯劑中。用一切完物。俱破殼研之。如豆蔻。蘇子。益智。骨脂之類。不則如米之在穀。雖煮之終日。米終不熟。臘是故也。凡用香燥。如大香。沉香。砂仁。豆蔻。不宜久煎。點泡尤妙。

口藥品製度法

藥之製度。猶食中之調和也。食品之加五味。非調和不能足其味。大藥有良毒。不請修治。豈能奏効。製如參。連。知。栝。用。乾。頭。而。

手足皮膚者。須酒炒以其性沉。氣微。酒力可上騰也。用治中焦。酒洗下焦生用。黃連去痰火。酒炒去胃火。和土炒治吞酸。同吳茱萸炒。此各從其宜也。黃川行太陽經。酒浸陽明經。酒洗況其性寒。力猛。氣弱之人。須用熨熱。否則必寒傷胃也。地黃知母下在藥也。用之須用酒浸。外恐寒胃。地黃用治中風。非黃汁。酒炒。恐沉膈也。苦參龍胆酒浸者。制其苦寒也。當歸防己天麻酒浸者。助發散之意也。川芎大蘇附子其性劣。灰火中浸。湯炮之。梨去皮。膽及尖。再以薑酒浸一宿。制其燥毒也。半夏湯泡七次。南星水浸。俱于腰月水浸兩三宿。去其燥性。更妙用治風。亦俱以薑汁浸一宿。南星治癰。癰以黃牛胆醃陰乾。取壯其胆。

氣也。吳茱萸味惡，須湯炮七次。麻黃先煮兩沸，去沫，免令人煩。
兩山梔仁用酒陰水炒令色變，不經至，蟲斑猶乾，淡非，極盡不
能去其毒，生則令人吐，逆不已。巴豆性最急劣，有大毒，不去油
真用，大戟甚花，甘遂尚陸，其能亦暴，非炒用，峻和不已，蒼朮氣
烈，非水泔浸，經宿，燥性不減，用指金石并子仁之類，須各另研
細，方可入劑，但製法得法，而藥能施功矣。余見今人素力入市
藥圖省儉，不疑有誤，不惟炮制失宜，抑且真偽未明，多少不合。
全失其臣佐使用藥之法，大非中藥治病之心，願人爲致誤伊
誰之咎耶。凡遇修合，必須選取真藥，如後法務在至誠，毋得
忽也。用火煨者，必於地上取土，久積爲妙，信隨土自有制法，不

新改刊

人參三邊人生熟酒洗一二門冬水調熟地酒洗一二門冬水調熟地酒

木香水調熟地酒洗一二門冬水調熟地酒洗一二門冬水調熟地酒

麥冬水調熟地酒洗一二門冬水調熟地酒洗一二門冬水調熟地酒

甘草生用熟地酒洗一二門冬水調熟地酒洗一二門冬水調熟地酒

附片生用熟地酒洗一二門冬水調熟地酒洗一二門冬水調熟地酒

子雞生用熟地酒洗一二門冬水調熟地酒洗一二門冬水調熟地酒

龍胆生用熟地酒洗一二門冬水調熟地酒洗一二門冬水調熟地酒

鹿角生用熟地酒洗一二門冬水調熟地酒洗一二門冬水調熟地酒

鹿角生用熟地酒洗一二門冬水調熟地酒洗一二門冬水調熟地酒

天雄附子帝使發主皮切四洗炒天旋覆花去毒兜鈴水水

元參生者南星炮去洗炒天疾熱酒炒大黃酒用

天雄附子帝使發主皮切四洗炒天疾熱酒炒大黃酒用

天雄附子帝使發主皮切四洗炒天疾熱酒炒大黃酒用

天雄附子帝使發主皮切四洗炒天疾熱酒炒大黃酒用

天雄附子帝使發主皮切四洗炒天疾熱酒炒大黃酒用

天雄附子帝使發主皮切四洗炒天疾熱酒炒大黃酒用

天雄附子帝使發主皮切四洗炒天疾熱酒炒大黃酒用

天雄附子帝使發主皮切四洗炒天疾熱酒炒大黃酒用

天雄附子帝使發主皮切四洗炒天疾熱酒炒大黃酒用

天雄附子帝使發主皮切四洗炒天疾熱酒炒大黃酒用

椿樹白皮酒洗 蜜蒙花酒洗 麻仁炒 扁豆炒 乳香酒洗 沒藥酒洗

蒼子炒 熟地酒洗 黑白丑研 蘇合香酒洗 丁香炒 木蛇全 蝎炒

烏藥酒洗 大腹皮水洗 酸棗仁生 龍安神 柏子仁炒 牡丹皮酒洗

地榆酒洗 白朮酒洗 茯苓酒洗 明子炒 蟬退酒洗 斑蝥酒洗 貓同 大木炒 葶藶子炒

必連酒洗 白朮酒洗 雄黃砂 砂水 石膏研 赤白石脂水 自然銅酒洗

代赭酒洗 雄黃砂 砂水 石膏研 赤白石脂水 自然銅酒洗

磁石酒洗 雄黃砂 砂水 石膏研 赤白石脂水 自然銅酒洗

研水酒洗 陽起石火 酒洗 白礬酒洗 龍骨酒洗 阿膠炒 石決明酒洗

研水酒洗 陽起石火 酒洗 白礬酒洗 龍骨酒洗 阿膠炒 石決明酒洗

研水酒洗 陽起石火 酒洗 白礬酒洗 龍骨酒洗 阿膠炒 石決明酒洗

虎胥骨多五蒸脂酒洗去沙用炙瘰癧火煨入瓦礫中搗泥
火煨海螵蛸炙桑螵蛸炙透昆布水海藻水淨射干湯泡去黃
水洗石硫黃用絹大罈盛之水煮三日夜以皂角湯淘去黑水再
土硫黃辛熱臭止可入瘡科外治不堪服餌
食堅本草
無求子尤乘手輯

口五味類

水味甘淡無毒大益人資生日用不齒其功故不可一日缺也
井泉平旦第一吸者佳

酒味辛熱飲之體軟神昏是其有毒也惟略飲三五杯御風寒
通血脈壯脾胃而已若恒飲雖多則熏灼心肝生痰動火甚

則損腸胃損筋傷神損酒藥入無影不可飲酒
後食辛辣物多則縱人涼胃凡中藥毒及一切藥從酒得者
難治益能引毒入經絡故也

醋多助肝損脾目及人皆壞人顏色能消癰腫調敷藥用

茶味苦氣清能解山嵐瘴氣之氣江蘇雲露之毒及五辛炙博
之熱宜少飲不飲尤佳冬飲去人脂令人下焦虛冷飢尤不
可惟飽后飲一兩盞不妨切忌點鹹及空心啜大傷腎氣古
云空心茶叩時酒酉時飯皆在禁例俱宜少用食後用濃茶
漱口令齒不敗

鹽味甘鹹寒無毒除熱湯火毒殺百藥毒殺一切魚肉葷蔬

毒并治蛇蟲螫等毒醬汁醋入下部治大便不通灌耳中
治飛蛇蟻蝨入耳塗狂犬咬中傷毒水調服即愈

醋經味甘溫無毒消痰潤肺止咳補中健脾打損瘀血者煮酒服能下惡血解附子草烏毒腎病忌甘甘傷腎骨痛齒痛者皆忌

口栗類

粳米晚熟者佳。忌與蒼耳馬肉同食。冬春湯熱性最清。藏府小兒初生者粥汁。如乳量食之。開胃助神。稍長同煮。是煮粥食之益精強志

糯米久食。身軟。偏寒。風動氣。妊娠。與鮑肉同食。令子生。寸白

蟲且性溫而味甘宜下酒

黍米

黍小失有數種慶之精者為黍米之精者為種性

小兒食之不能行發宿疾令人

好睡不可與白酒羹菜牛肉同食有赤黑數種北方所種多

是秫黍又名黃糯只可作酒此米雖動風惟肝病宜之食粟

米後食杏仁成吐瀉

稷米

即粳米

因其早熟清香用之祭祀食之發二十六種冷病不

可與瓠子同食

香稻米

即紅連米

其熟最早晚熟者更能開胃益中澀滑補精惜不

能多種耳

菱米

即菱

古人以為美饌作飯亦脆而泄止渴解煩熱調腸胃

即麥曰
子也

麥占四時秋種夏收北方多霜雪麴麴而益人南方少霜雪

麴有濕熱而損人去皮則熱帶皮則涼經真人曰麥乃心之

穀土養心氣心病宜食之秋種夏收春秀冬長具四時之氣

之發

病

浮麥即水浮浮止盜汗虛熱婦人勞熱以其麥皮重

大麥久食多力健行令髮不白能寬胃除脹煎湯煮洗立效大

麥芽消積健脾多服消腎

蕎麥性沉寒久食動風心腹悶痛頭眩和豕肉食令人思風脫

眉髮和穀食能殺人治小兒火丹赤腫以蕎麥粉醋調敷之

白扁豆和中下氣治霍亂生癰解河豚毒酒毒及一切草木之毒與老不宜入

黑豆清熱解一切食物諸藥毒不可去皮去皮壅氣消腫毒作枕明日治頭風

赤小豆利水排腫毒止瀉利消脹滿下乳汁久食令人虛不可同魚鮮食中酒煮汁飲立解又治小兒火丹上下不定為末醋調傳之効

黑豆入腎逐水消腫消瘀血忌同豕肉食十歲以下小兒馬華不宜食恐掩氣以黑豆入鹹者食補腎口李守愚每晨水吞黑豆二七粒謂之五藏穀到老不衰此種小粒馬料豆

蚕豆快胃利藏多食發脹可作醬忌同豕肉食

豇豆理中補腎止渴止痢小便頻解鼠蛇毒

豌豆益氣和中殺鬼氣作醬作腐極佳凡豆總與豕肉魚鮮

不可同食

芝麻黑者炒食不生風疾有風人食之良油煉熟宜食能解諸

○菜類

松菜利腸胃消食下氣解酒渴去魚腥或食之覺冷薑汁能制

之一云夏至前食發皮膚風痒勸氣發病

青菜四季常有通腸胃結滯利大小便和中下氣

白菜主通利腸胃除煩熱解酒毒

菠菜多食滑大小腸令人脚弱不能行

油菜冬種春長形如白菜通結利便根微紫抽嫩心開黃花及
其莖為菜茹甚佳子取榨白味同麻油色略黃耳

芥菜歸脾利九竅止冷嗽冷氣多食動風不可同鯽魚食發水
腫同兒肉發惡瘡子能消痰治風痺腫毒醋研敷

薺菜即野薺利肝氣和中子主明日去翳赤痛根燒灰治赤白痢瘡

韭菜歸心下氣止洩尿血治心腹冷痛多食助陽昏目滑食香
夏食與冬食動宿疾五月食昏人之力不可同牛肉及蜜食
未出土為韭黃食之動氣病子治夢洩

莧菜有六種多食動氣生煩問其饔及蕨食成瘕其一種馬齒
莧入血分下胎臨產煮食佳又一種灰條莧野生者亦可食
王怡曰莧赤障

蕪菜生高田者宜人蕪薪根美置酒醬中香美和醋損齒三八
月勿食水蕪忌成蛟龍瘕

符菜生湖陂中葉紫赤圓徑寸餘浮水面莖如銀股上青下白
詩所云參差葉是也可滷爲齋

石花菜天寒膏去上焦津液發下部虛寒

紫菜出海中多食令人腹痛吐白沫飲少醋卽解

蘆菜生水中性溫發精

唐花集通續氣利腸胃生平澤中取為藥亦甚香美

胡氏久食令人健忘脚軟腿發痼疾惟發痘疹用之

逢高安心氣養脾胃消痰飲多食動風發氣

萬普利水久食昏人目殺蟲蛇毒

獻王蒸執利水道令人多腫脚弱生食成瘕

微生水旁與似蒸熟食利人久食不飢調中利水治浮腫潤腸

葱與蜜同食作服下利腹痛燒葱同蜜食壅氣死葱與雞雉白

犬肉同食九竅出血死大抵葱切只可發汗多則昏神

蒜碎瘟疫惡氣快胃消滯久食生痰動火傷肝損目弱陽食蒜

行房今面無顏色治魚骨鯁塞鼻即出又治蛇傷楊仁立効

忌魚鮓蜜同食

白蘿蔔消痰下氣解麪青豆腐尋久食耗肺氣生食滲血忌與人參地黃黃芩同食令人鬚髮白丹煥云熟者多食成溢飲
治乳癰初腫痛取鮮者去土不用洗加鹹少許搗傅熱即換之冬無葉根可代子治黃疸及目如金小水熱赤爲未白涼湯調服水初服吐風痰醋研塗消瘡毒

胡蘿蔔實中下氣散腸胃邪滯

茄子性冷發風動氣及瘡毒燒灰治口疳甚効

黃瓜清熱鮮渴利水道

諸竹筴消痰利膈發冷氣替竹筴治不睡去血目并黃解

酒毒多食令人嗜雜

猶竹筴生於冬不出土者曰冬笋小兒痘疹不出者謂食

蘆筴治噎膈解河豚毒 蒲笋主熱燥利小便

芋充飢實胃多食滯氣冬月食不發病和薑煮良

芋菜苗治妊婦心煩迷悶胎動不安

野芋有毒中其毒土漿蕪汁可解

茭白不可合生菜食及蜂窠食損腸氣發冷疾補食頗佳

匏子滑腸不宜人 葫蘆匏有毒令人吐逆煩悶

蘇及除熱利腸枯者燒存性人硃砂末研勻蜜水調發小兒痘

疹甚効以其通行經絡血脈涼血解毒又能下乳汁通二便

足上瘰癧之疾。葉治解瘰癧。按擦之。瘰癧疽下腫邪。

西瓜消暑熱解煩渴。亮中下氣。利水止血病。

冬瓜利水止渴。多食反令牙痛。動胃火。又令濕痒生瘡。發黃疸。

九月勿食。老人小兒不可食。

南瓜多食發黃疸。脚氣不可同羊肉食。壅氣。

茱瓜即生瓜又名越有青白二種。不宜人。凡瓜苦者及同鼻兩帶者害人。

茵芋因濕氣重寒所成。生山僻處有毒。殺人在木生者為木耳。

菌有多種。惟楮榆柳桑槐。木之耳可食。生野田者有毒。

者殺人。冬看無霜。夏秋有霜。夜有光欲爛無毒者。上有毛下。

無紋者。仰卷赤色及煮之不熟者。煮訖照人無影者。並有毒。

中其毒者地漿及糞汁可解蓋因投以薑椒飯粉如紫色者
殺人凡中其毒者必雙不止所以暫未和汲水吞之以苦若
并吞無不立愈

松葉治樓渴不禁食之有勁

杉葉治心脾痛 香菌益氣 能治風破血

柘葉治肺癰不拘濃成末或酒一兩折末百兩煎藥丸如桐

子大木候下 止効

臭 遠不可食治積垢痛泡無 飲不効再服愈

替依齒 益腸胃化腐生肌多食發病

雞從 治痔

紹興治癰結氣痰飲

時雖即小下氣和胸小兒氣脹穀食困澀補腎氣壯筋骨

大商通開胃下氣逐膀胱冷氣補命門不足暖丹田黑鼠肉少
許即解多食傷神發瘡

砂仁和胃醒脾快氣調中安胎

山藥主和中補虛生傳癰腫兩產甘涼於北其寒微下不燥上
結者磨下山藥補虛益腎

百合潤肺止嗽利二便除浮腫痘癰瘰食良花酒小兒天泡瘡

晒乾研末紫酒調塗干紫酒風下血酒炒研末酒服紅花者

名山丹治瘰癧女人崩中產後功同數服并効

何把藥無刺者是生華葉補氣益精除風明目堅筋骨補勞傷
根名地骨皮根葉子俱可食和羊肉作羹和粳米煮粥八蒸
豉五味補虛元勝

生薑專開胃止嘔吐行藥性制半夏毒諺云上床難當下床難
益夜食則難消可消清晨則薑能禦風解穢開胃通神九月
九日忌食損壽

○菓類

藕以鹹水供食則不損口同油燂麪米食則無害解熱渴散留
血蒸煮服之大能開胃生食治虛渴解酒毒熟食補五藏養
下焦同蜜食令人腹藏肥不生諸蟲汁解蠱毒殺蟲輕身延年

雞豆無雙

小兒多食令不長土食動風發氣熟食益腎固精合

蓮子作粉益人和金櫻子膏丸食之謂木陸丹補下元久服

耐老不飢

菱角即菱

生食性冷多食傷人薑酒解之熟食閉氣

烏豆即黑豆

消食除滯性毀銅不可多食

慈姑多食發虛熱及腸風痔漏崩中帶下孕婦勿食鴉片傳小

兒赤瘤丹毒即退

李多食令人臃服發痰瘡霍亂氣寒晒乾食去病疾胃中勞熱

肝病宜食之不沉水者有大毒

桃多食令人熱作肺食益顏色肺病宜食之

否多含傷筋子酒精人止渴去冷執壽心病宜食之

生津止渴多食其效如指烏梅安虻止利欬肺白梅即鹹梅
名霜梅以通痰厥牙關緊閉者取梅揩擦涎出即開又治瀉
利霍亂下血功同烏梅

適與相同酸者聚痰甜者潤肺亦不可多食

過多食傷肝氣切和鹹蜜煎成貯食止惡心去胃中浮風惡氣
發燥療殺魚鱗其皮能醒酒

香圓佛手柑並下氣除心胸痰水煮酒飲

金柑下氣快膈止渴解醒辟臭皮尤佳

枇杷止渴下氣止吐逆利肺熱潤五藏忌同炙食及

楊梅多食令人發熱損齒及筋骸藏食去痰止嘔消食燒灰服止痢甚驗忌同生葱食

櫻桃調中益氣令人好顏色止泄痢不可多食有暗風人不可食食之立發

甘蔗同酒食發痰多食發熱動衄血與穉子食則查軟和中下氣利二便止反胃嘔逆寬胸

石榴多食損肺損齒凡服餌人尤忌皮止久痢崩帶

梨種不一性俱冷利多食有損金瘡乳婦血虛人尤忌治熱嗽煩渴中風不語傷寒發熱解丹石毒酒毒瘡毒切片貼湯火傷止痛不瀾汁吐風痰暗風不語生搗汁煩服胸中熱結痞

寒者外宜之

烘棟其種亦多所至皆有通耳氣止渴去胃火止腸胃飲虛
同食則易醉或令心痛欲死別錄云解酒則失之矣乾柿制
者補虛勞不足消宿血閉胃潤肺止吐血反胃治瘧疾血瘕
痰止火嗽及咽喉口舌瘡癰

蓮子補中益氣止痢及遺精女人崩中帶下

荔枝多食令人發熱能止渴益人顏色醫痘瘡

龍眼安神補血益志和脾小兒不可多食

荔枝性熱不可多食多則生疾動火令人咯血肺病尤爽

淮橘寒喘咳同人參煎服甚良又益命門補下焦同補腎所

五
卷八
諸九服遲腰痛痛油者殺此攻毒潤鬚髮

聖生食損脾胃作泄與膏食須五穀蒸食和諸藥補脾齒病疳病
中痛皆忌小兒尤忌同葱食令臍腹不和同魚食令腹脹痛
其味甘溫方中中薑薑爲引取辛甘之味生發中氣若無溫
糧食生蟲損齒脂害多矣

小
增
多
今
心
痛
鯽
魚
同
食
成
疳
并
同
食
成
瘕
身
重
不
能
行
小
兒
不
宜
食
生
疳
損
齒
和
藥
用
則
有
緩
肝
調
脾
之
効

聖生食難消熟食滯氣日暴火悞令出汗殺其本氣或炒食乃
可患風氣人忌之相傳有人腰脚病往栗樹下食數升便可
起行此是補腎之功然慙生吹若服餌則宜禁房事與移朝

俱醫家之界。筋骨傷。命及金匱倉卒生。喻冷之有効。又有一
錢三顆。其中有扁者。名栗椹。主活血治痛。尤効。

食牛肉過多。食笨子兩三枚。即消。

銀查。即生。多食令人腦脹。惡氣動風。小兒食多。羶亂發。引疳。

用鯪魚食。患軟風。生食降痰。辟酒殺蟲。疳積。塗而及手足。去
破。蛇蝎咬。及疥癬。疳瘡。陰蝨。能入肺經。益肺氣。定喘。嗽。縮
小便。生肌。能浣油膩。則其去穢之功。可類推矣。但其性主收。
多則氣壅。食滿。干枚者。死。

條仁。益氣力。寔腸胃。調中開胃。健行止飢。

慳子。性熱。煮。蒸。羹。味甘。美。猪。脂。炒。黑。皮。自。脫。同。鵝。肉。食。生。慳。能。

風槌皮反菜豆能殺人療五痔殺寸白蟲消痰助陽通腸
白濁皆治久食滑腸同甘草食其香自散

松子潤燥結同栢子仁治虛秘補不足

楸子即青生食解酒毒消魚毒開胃下氣止瀉生津治咽

然性熱多食能致上壅

楸仁治胃功燥疼研爛塗之核漿汁服治諸魚鱗

用楸大熟炙食令人之氣喘促開口者有青治邪氣疾逆酒
下氣除大疔寒冷心腹留宿食下利減腫散風邪疔結水
腫黃疸殺蟲毒久中通血脈堅齒髮明目諸陽節腰脚不
運可作膏藥補命門腎炁蟲縮小便

巴達杏 甘平止欬下氣消心腹逆悶

杏核仁 入手太陰肺其用有三潤肺也消食積也散滯氣也杏

仁治氣桃仁治血俱療便秘。當分氣血。晝則便難行氣也。夜則便難行血也。故虛人便秘不可過洩。服浮屬氣用杏仁陳皮脈沉屬血用桃仁。陳皮手陽明大腸手太陰肺竅門主往來。魄門之收閉為氣之通道。故並用陳皮佐之。雙仁者殺人。可以毒大。大咬人同白。糖搗俾甚良。

口禽類

鵝 各家白者食草無毒。蒼者食強有毒。發瘡腫性並冷多食令

人霍亂發風動氣。卵尤不可食。火熏者尤毒。然老者良解五

藏熱服丹石人宜之

鴈

一名鴈

與燕往來相反有四德春往夏來信也飛則有序禮也

失偶不再配節也夜則巡警智也大曰鴻小曰雁六七月食

之主傷神氣治風麻痺久食動氣壯筋骨利藏府解和石毒

鵪鶉

即鵪鶉

黃雌鴨爲補白者良黑有毒滑中發冷脚氣人不可食

腸風下血人不可食嫩者毒老者良六月忌食鴨目白者殺

人卵勿與蒜蠶同食殺人口勿同胡桃豆豉食野鴨九月殺

宜食熱瘡久不好多食愈

雞黃者宜老人鳥者宜產婦烏雞白頭及六蹠四蹠者死不得

足口目不閉卵有八字紋者俱不可食烏雞合鯉魚食生

痘疹敗血小兒尤不宜食同生葱食成蟲痔同糯米食生瘰
瘰間難能常有毒四月勿食地餅令人作瘰成漏

雉
訓野雞

秋冬益人春夏有毒下痢人忌食與胡桃同食發頭風
眩運及心痛與菌木耳食發痔血與蕎麥食生蟲卵同葱食
生寸白蟲自死瓜甲不直者殺人

鴿

本草云蝦蟇所化痢疾宜用和小豆生薑煮食同猪肝食
面生黑子與菌食發痔

麻雀

小面黃者黃雀

不可同猪肝及黃食妊婦尤忌令子多淫凡

丸人忌之冬食補益他月不利雀肉和蛇床子熬膏和藥丸
服名驢馬丸壯陽益腎雀卵更勝五月收取

鵲 即天

益人氣力。利藏府。醃炙食之。油塗癰腫。良治小兒耳疳。

調草烏末入龍腦少許和傅。立効。無則雁油可代。

○獸類

豕 即猪

雖世常用。不宜多食。發風動氣。生痰白猪白蹄青瓜者。

不可食。賢理腎氣。多食反令腎虛。少子心損。心氣肝助肝大。

小腸 **骨腸** **腦** **損陽道** **嚼并耳**

助風毒肺療肺虛咳嗽竹刀切。

片麻油炒同粥食。治嗽血。煮雞以七未食之。良胃補中益氣。

無毒猪肉合羊肝食。令人煩悶。凡諸獸蹄殺驚氣。人心絕氣。

入肝並不可食。俱敗血。

羊肉

補虛助氣。與參芪同功。解食傷。人心腸損。心少子心有。

乳者殺人肺發氣旺明日肝有瘕者黑頭白身者并獨角者皆不可食六月忌食餌地黃補劑皆忌。

取牛肉雞肝用五藏血能補血乳能補中養血但忌與醋醬食凡黑牛肉頭雞肝皆忌夏月卒死及瘟死者板毒殺人不可食氣亦傷人服藥者忌之。

馬肉無益不可食馬汗氣及毛誤入食中害人凡有汗陰瘡者近之殺人。鹽肉動風發痼疾。

驢肉動風發瘡脂肥者尤甚不可與酒同食致暴疾殺人。

犬肉大熱助陽暖下元食者忌茶白犬虎紋黑犬白耳畜之家富貴與青者識盜賊則吠純白者不可畜春末夏初犬多發。

狂被咬者必害宜預防之凡犬不宜食合人消渴大月傷神

鹿肉血大補血肉不甚補反痿人陽五月勿食服餌人忌之以

其善食鮮毒之草故也

鹿肉六七八至十一月食之勝羊血餘月發風動氣

鹿肉鹿之發痼疾以其食此也

獐家畜者可取看其晴定時子午卯酉如一線與中已亥如滿月辰戌丑未如棄被也向能

補陰治勞症強毒癰瘰癧瘡香狸鎖心辟邪

狐肉皮可為藥補虛損暖中祛風及五藏壯氣煮食之

貉與猪同補虛勞及女子虛僂補虛狗食切並同

木狗肉無益皮治脚痺風濕氣活血脈暖腰膝

兔肉 八月至十月可食餘月損神兔死而眼合者殺人獨月不

可食勿與雞肉及肝心食平婦忌

功能補中益氣涼血解毒

水獺肉煮汁服療疫癘及牛馬時行病損陽不可同界肉食獺

肝治肝癰勞瘵鬼魅許叔微云五藏蟲皆上行惟肺蟲下行

當用龜爪為末調藥於初四初六日則胎蟲上行也

海狗

即脂 脂似射香黃赤色如爛骨取其外腎陰乾百日味甘

香美治五勞七傷鬼氣尸疰強陽暖腰膝心腹痛

貂鼠肉甘平無毒毛皮拔脂沙眯目即去

○魚類

鮑魚 發風熱一切風疾及瘡癰瘰癧疳癥並忌

鯉魚溫中益氣多食令人熱中發渴發瘡疥

青魚脚氣濕痺同非白煮食服死人忌之

鱖魚開胃利五藏令人肥健與百藥無忌

白魚功同鱖魚宜醃糟不宜炙食與棗同食患腰痛飲酒不登

食之作膿經宿者不可食令人腹冷

鰣魚開胃腹中作蠶尤良 鱈魚助火生痰發疥不可食

鱸魚初夏有餘月無發痼疾生疳補虛勞

鮠魚令人肥健益氣力腹中子毒令人下痢

鮓魚合五味煮食主虛羸溫中下氣生下利腸痔同沙糖食生

蟲同芥菜食成腫同猪肝雜肉食生瘰腹寒令人忌

鰻魚調可氣利五藏和齊食助肺消殺作鰻食助脾功與鯽同
諸病人勿食。

鰻魚 養諸藥毒鮮不益人合筭食成癰疽小兒食成瘦

鰻魚 多食發瘰癧瘡腫補胃治水氣

鰻魚 有十二骨每月一骨有毒殺人但者取橄欖仁末流水

調服即解核磨汁水調亦可

鰻魚 暖中益氣非海中沙魚即南方溪澗中四五寸小者

鰻魚 寬中健胃細者名銀魚粗者名鰻殘功同

鰻魚 有七晝夜朝北斗道家齋錄所戒

鰻魚 此魚無雌附生於鰓鬚之上故名鰻 鰻殺蟲治五痔惡瘡

理傳戶疰氣療濕脚氣

鰾魚

俗名黃鰾

黑者有毒性熱能補時行病後食之多復動氣多食

則霍亂血冷口眼歪斜少加射香効

河豚

毒之所在腹之子目之睛春之血有損無益浸血不盡有

紫赤斑眼者及誤破腸子或修治不如法及染屋塵皆脹殺

人肝與子大毒犯者以橄欖汁或蘆根汁解之及糞汁並解

鰾魚

即黃魚

滑腸動火今所名黃魚者石首魚也頭中有石治石淋

燒灰水磨皆可服

口介類

蟹

清熱去勞皆殺鼠稜者為蟹螯螯有毒團魚不益人夏月燒

頭骨於床下水乳者死置其骨於衣箱及檀衣中不生蛙一
切魚忌煎芥能殺人凡魚有異色者不可食凡鱉目赤三足
獨目頭足不縮腹下紅或王字卜字形及蛇紋者皆蛇化也
不可食。

田螺大寒治目赤醒酒。

螺螄功同上

蝸性極冷。令人腹疼動風疾皆有足跡。生不全獨螯獨目足
斑目赤。腹下有毛。腹中有骨。俱殺人。孕婦忌之。未破霜者有
食水莖者甚良。害人。紫蘇汁。木香。蘇汁。蘆根汁並解。

蚌止渴除熱解酒。明目去赤。女人下血。

蛭多食發嗽及冷氣消腎功似蚌同。

蛤蚧止渴解酒開胃痘毒入目以蛤蚧中水點之可代空青及

丹石燒煨成粉同香附末治心氣疼白湯服

淡菜治虛勞吐血婦人帶下多食令人煩悶發丹石毒

蝦蟇風動火無歸者勿食小兒及雞犬食之並脚弱者煮之腹下

通黑鼓反白者勿食小兒赤白遊腫搗碎敷之作湯下乳托

痘吐風痰法製壯陽道風膏傳蟲直

理內治虛主冷痢女人產後虛損者食之

天行後不可食

口器藏類

凡諸肉汁藏器中氣不泄者有毒食之令人腹脹作瀉以銅器

蒸銅生汁滴下者亦有一黑一蒸水過夜者不可飲

空屋漏水。誤食成瘕。瘕一瓶內。種花宿水。有毒。殺人。

飲食放露。天飛絲。墮其中。食之。喉腫生泡。

暑月磁器。烈日晒熱者。不可便放食物。令人煩悶。

盛酢瓶。不可貯蜜。貯蜜。瓶不宜作酢。並不宜食。令人腹吐。

凡諸肉雞魚。經宿者。不再煮。勿食。食之。吐瀉作脹。

凡祭神肉。自動祭酒。自耗。並不可食。

諸禽獸腦。敗陽滑精。不可食。惟牛腦益婦人。

口解毒類

食薤腐中毒。蘿蔔湯可解。

菌毒。地漿水可解。

野牛毒。上

諸菜毒。甘草貝母胡粉等。分爲末。湯調服。小兒溺亦可解。

諸瓜毒。木瓜皮湯解之。鹽湯亦可。

諸果毒。燒猪骨爲末。酒調服解之。柑毒。柑皮煎湯解之。鹽湯亦可。

誤食閉口。花椒醋解之。雞三毒亦同上。

誤食桐油。熱酒解之。乾柿及甘草亦可解。

中諸魚毒。橘皮湯。黑豆汁。膚根汁。朴硝可解。

中諸肉毒。陳壁土。錢許調水服。白扁豆末亦可解。

食諸肉傷者。燒其骨末。水調服。芫荽汁。韭汁亦解。

猪肉傷成積者。草果仁消之。凡中諸毒。以香油灌之。即愈。

飲酒中毒。大黑豆一升。煮汁二升。頓服。立吐。即愈。或生蠟。鹽湯。

鹽茹煎湯並解。

飲食後心腹煩悶不知中何百石煎苦參汁飲之令吐即解
或犀角湯飲之或酒煎犀角飲之立解

○病忌類

附五藏所宜食

肝病所宜小豆犬肉李韭

心病宜小麥羊肉杏蓮

脾病宜粳米葵菜

肺病宜黃黍米雞肉桃葱

腎病宜大豆

牛肉栗薑胡桃

有風病者勿食胡桃有暗風者勿食櫻桃食

之即發

時行病後勿食魚鱗及煙絲并鯉魚而復病不救

凡傷寒時病

後百日之內忌食椒羊肉并其腸血魚腥諸糟物

犯者必復病

凡下痢後五十日內忌食炙癰及胡荽蒜韭生

蝦蟇等物多致復發難治

腫後勿食羊肉恐發熱致重愈後

勿食諸魚及雞必復發 **眼病**忌川椒胡椒犬肉蒜韭并禁冷

水冷物 不忌則害無已時 **諸病**勿食菓及糖 **心痛及心經疾** 忌

胎前忌 忌肉 **脚氣忌**甜瓜瓠子鯽魚 食之牙不痊 **瘡癰忌**雞羹

黃疸忌羊鵝濕麤魚胡椒蒜韭炙烤醃糟物食之難愈

咯血吐血 **衄血**忌炙麤濕麤炙烤韭蒜薑椒燒酒糟 海味

癆風勿食鯉魚犯之不愈 瘦弱人勿食生薑恐傷中氣

病新瘥忌用薄荷誤食虛汗不止 入病人勿食杏李犯之加

重不愈 傷寒汗後不可飲酒恐復引邪入內 凡病疾人忌

食黃瓜麤筋鹿馬驢肉及雞肉犯之必發 凡產後忌 切生

冷肥膩滯硬難化之物惟粥不忌以其能和血也

○病後調理飲食法

凡一切病後。病愈。表裏氣血。耗於外。藏府精神。損於內。形體虛弱。倦怠。少力。乃其常也。宜安心靜養。調和脾胃。爲要。防風寒。慎起居。戒惱怒。節飲食。忌勞。除妄想。是其切要。若或犯之。即良醫亦難奏功。矣。勿以身命。等蟬。如燈蛾之撲焰。自損其軀。哉。戒之。戒之。例次如左。

一初愈。務宜衣被適寒溫。如太熱。發渴。心煩。助虛熱。如寒。則又令外邪仍入內。

一傷寒時疫。身涼。後宜進青菜湯。疎通餘邪。如覺腹中寬爽。再進陳倉米清湯。以開胃。中穀氣。一二日後。可進糜粥。棧膏。

日三四次或四五六次。慎勿太過。或用陳豆豉或清不之物適口。或清水煮白黍醋點極妙。再漸進活鮑魚湯。調理百日。方無食復勞復等病。

一食後復發熱。宜斷穀。即愈。服調脾胃之劑。切勿用驟補熱藥。須從緩處治。能收全功。

一切病忌食猪脂。濕雞羊。臙滯煎等物。犯之復發難治。中風後忌服辛散香燥等藥。及猪羊鵝雞魚腥。香薷菜。玉滯氣發病等物。

一病後切忌房勞。犯之舌出數寸死。

一勞嗽乾熱水腫喘急。宜飲良薑鹽湯。

一 產後忌食酸食及香酢滑利諸血之物生冷梨瓜之類

一 產後發背忌同傷寒

一 產後喘咳骨蒸忌用大熱滋補等藥宜服補陰藥培養元氣庶幾可也

一 產後切禁寒涼等物雖在酷暑之日亦所不宜世多誤用以致傷生特為拈出

一 產後不善調攝多致危殆因其忽略保護故也

凡病後如冰浮泥喘上乾之後最怕重複冲激再犯不救今且食治方於左為保身者之助并利畏服藥者以便於養

食法秘方

客曰萬病皆從口入如何
食反能治病耶蓋草木藥石得五
行之偏氣如人之得疾因五藏有偏勝則氣血有偏傾故用
偏氣之藥物治五藏偏勝之氣血使得歸其正然中病則已
不可過焉過則藥又反能生病也是故飲食人賴以養者貪
嗜之所以為病皆從口入之說亦猶是耳且五穀得五行
之正氣何有是說蓋食者陽氣食養陰氣內經言之詳矣五
穀為養五藏為助血氣調和長有天命何況今人忽而不講
惟知藥可治病不知飲食起居之間能自若察得以却疾延
年也古人食節之方良在節意衛生者鑒之

治傷風感冒

治傷風感冒。好娠胎動產後血暈。

用糯米煮粥。臨熟入葱。數莖再略沸食之。

羊脂粥

治半身不遂中風

用羊脂八兩。梗米。葱白。薑椒。豉。煮粥。日食一具。十日効。

羊耳粥

治目暗不明。及諸風鼻流清涕。兼治下血痔瘡。用

耳子五錢。取汁。和米三合煮食。

烏雞粥

治中風煩熱。言語秘澀。手足發熱。

用烏雞肉半筋。葱白一握。薑熟八片。油鹽豉。煮令熟。空腹食。

黃牛腦干酒

治遠年近日偏正頭風

用牛膽一箇切片白芷川芎末各三錢同入磁器內加酒煮
熟乘熱食之盡量而醉醉後卽卧卧醒疾若失

猪胆酒 治赤白癰疽

用猪胆一具酒浸一時飯上蒸熟食不過十具愈
又方白煮猪胆一枝食之頓盡三個愈切忌房事

口塞門

乾薑散 治一切寒冷氣鬱心痛胸腹服痛

用白米四合入乾薑俱煮各一盞煮食

生薑煎 治反胃羸弱

生薑切片麻油煎過爲末煮粥食

生薑酒

治霍亂轉筋入腹欲死心腹冷疼

生薑三兩搗陳酒一升煮兩三沸服仍以查貼疼痛處

生薑醋漿

治嘔吐不止

生薑二兩醋漿二合銀器煎取四合連查嚼呷又殺腹內蟲

萊菔粥

治心氣痛不止胸腹脹滿

用吳萊菔二分和米煮粥食之 又方川椒茶治同

丁香熟水

治亦同上

丁香二粒打碎入壺傾滾水在內其香勃然大能快脾胃

氣定痛辟寒

肉桂酒

治感寒身體疼痛

用辣桂末二錢溫酒調服腹痛泄瀉俗以生薑與黃蘗酒俱
効如跌撲傷墜疼痛瘀血爲患宜用枳枝

薑葉湯

治一切冷氣心腹脹滿胸膈痞滿噎逆嘔吐泄瀉虛
滑水穀不消困倦少力不思飲食

痛內豆蔻仁四兩麩炭煨甘草炒一兩白麩炒四兩丁香五
分鹽炒五錢共爲末每服二錢沸湯點服空腹

○暑門

菜豆粥

解暑渴一用菜豆淘淨下湯煮熟八米同煮

菜豆酒

治同上

用菜豆蒸熟浸酒服

反方加黃連少許

桂漿

解暑湯。主熱生涼。益氣消痰。

官桂末二兩。白蜜二兩。先以水二斗煎至一斗。候冷。入磁神中。入桂蜜二味。攪一二日。餘過。先用油紙一層。外加綿紙數層。以繩封之。每日去紙一重。七日開之。氣香味美。或以稻封。或井中一日。水涼可。每服二杯。百病不作。

白麝門

急攻強

去濕氣。腫脹。利腸。胃功。勝諸藥。

用薏米淘淨。對白米煮粥。入白糖二匙。食。

仙李仁粥

治水腫。腹脹。喘急。二便不通。體重。煩痺。轉動不能。

脚氣亦宜。

郁李仁二兩研汁。和苡米五合。同米煮粥食。

赤豆粥 利小便消水腫。脚氣辟邪癘。

赤豆淘淨。同陳倉米對配。煮粥空腹食。

赤小豆飲 治水氣脹滿。手足浮腫。氣急煩悶。

赤豆三升。槲柳枝一升。同煮豆熟。為糜。去滓。取豆食。湯
則飲汁。勿食他物。自効。

桑皮飲 治水腫。腹脹喘急。

用桑根白皮四兩。和米四合。煮粥可食。

紫蘇粥 治老人脚氣。

用家園紫蘇細搗。入水取汁。煮粥。將熟。量加蘇。三升。食之。

鯉魚膽

治水腫。滿悶氣急。不能食。皮屑欲裂。四肢常疼。不可

用鯉魚十兩。葱白一握。麻子一升。取汁。煮作羹。驛入鹽豉。薑

椒調和。空心慢食。

又方。鯉魚二觔。陳皮二兩。煎爛。入青鹽少許。拌勻。食。

蒼朮酒

治諸般風濕。癢。脚氣下重。

蒼朮三十觔。洗淨。打碎。以東流水三石。浸二十日。去渣。以外
浸翅。如家造酒法。酒熟。任飲。不拘時。忌桃李。

松節酒

治冷風虛弱。筋骨攣痛。脚氣緩痺。

一方

松葉酒治
同造同

用松節。煎汁。同麴米釀酒。飲松針搗煎亦可。

白石英酒

治風濕。周痺。肢節濕痛。腎虛耳聾。

白石英磁石煨醋碎七次各五兩絹袋盛浸酒中五六日溫
飲如少加酒盡其力可也。

還巡酒

補虛益氣

去一切風痺濕氣耐老延年

久服

造法三月三日

收桃花三

五月五

收馬蘭花

六月六日

六兩九月九日

收黃日菊

已上俱陰乾

十二月八日取臘水三

斗待春分取桃仁

四十

去皮尖白麴

同前花和作麴

紙包

陰乾四十聽用

飲造酒煮糯米飯一升白水一

瓶麴一

瓶用

麴一塊封良久

酒即成矣如淡

再加麴一

瓶

五加皮酒

去一切風濕痿痺壯筋骨填精髓

五加皮

洗淨

前汁和麴米

釀成飲之或切

碎袋盛浸酒

煮

酒

煮

或加當歸半條地榆等

仙露脾酒

治風氣下遂強筋壯骨

仙露脾一觔浸酒二斗封固三日飲之

女貞皮酒

治風虛補腰膝

女貞皮四斤浸酒飲之

骨蒸酒

去風濕提筋骨健脾胃

用白米粉同延米麴之或將麥芽煮酒飲之亦可

海草酒

治瘰癧

用海藻一斤洗淨無灰酒日夜細

精藥酒

治諸瘰癧

麴香八斤

聖

用萬州黃藥切片一斤袋盛浸酒煮飲

○燥酒

生地粥

滋陰潤肺及妊娠胎漏下血目赤

生地搗汁米二合煮熟八汁一合調勻再煮加熟蜜少許

麻蘇粥

治產后血暈汗多便閉老人血虛風閉胸腹不快惡

心吐逆

用家園蘇子麻子各五錢水淘淨微炒研如泥水噓取汁八
米煮粥食之

百部酒

治久近一切咳嗽

百部切炒袋盛浸酒頻飲之

密酒 治風痺皮肉燥痒

沙蜜一觔糯米飯一片連五兩熟水五升同入瓶內封七月成酒尋常以盛入酒代之

人乳粥 潤肺通腸補虛養血

用壯實無疾女人乳汁俟粥半熟去湯下乳入湯者熟置碗中加酥油一二錢調勻食

槐枝酒 治大麻痺痺

槐枝煮油如常釀酒法

巨勝酒 治風虛痺弱腰膝疼痛

巨勝子二升炒苡米二升生地半斤袋盛浸酒飲

桑寄生酒 治風緩麻痺諸節不遂腹內宿痛

桑寄生炒碎袋盛浸酒服

五酒 治中風口偏不語角弓反張鼓脹不消

雞屎白一升炒焦投酒中待紫色類飲

○火門

甘蔗漿 治咳嗽虛熱口乾舌燥涕吐稠粘

用甘蔗取汁三碗入米三合煮粥空心食之

竹瀝粥 治痰火如神

如常煮粥法以竹瀝下半杯食之

黑豆酒 治陰虛痰火諸疾

用萊菔山藥各二兩黃柏半兩蘇合蜜各一兩半當歸二兩二錢甘草三錢以好酒浸之
背通酒 有火症及發熱不宜飲酒蓋酒性大熱助病為虐致不洽倘遇喜慶事必欲飲用此

以黃連菜豆各一錢枸杞三錢浸酒飲

黃柏酒 有相火而好飲者宜如生瘡疥及肌膚不澤

用黃柏一兩猪脰四兩生浸飲一味猪脰浸酒令婦人多

乳催乳更妙

小麥湯 治五淋不止身體壯熱小便滿悶

小麥一升通草二兩水煎不待可服白効

甘草湯

治一切煩渴。二便連少。及風熱入腎。

黑豆二合。甘草二錢。生薑七片。水煎服。

藕蜜膏

主虛熱口渴。大便燥結。小便秘痛。

藕汁蜜各四升。生地汁一升。和勻。慢火熬成膏。每服半匙。口含。食化。不時用。忌煎炒。

竹葉粥

治膈上風熱。頭目赤痛。止渴清心。

竹葉五十片。石膏二兩。水三碗。煎至二碗。澄清去渣。入米三合。煮粥。加白沙糖二錢。食。

四汁膏

清痰降火。下氣止血。

雪梨甘蔗。生薑薄荷。各等分。搗汁。入瓦鍋。文火熬膏。煩之。

飲即靈藥矣白木可

調理脾胃凡病後脾胃弱腹中虛痛

人參強壯脾胃吐酸及前後脾弱

用粟米一合煮粥入人參末薑汁各五錢和勻空心食

明參湯治咳嗽及番胃

用麥門冬浸汁和米煮粥妊婦食之亦宜

粟米強壯脾胃治脾胃虛弱嘔吐不食漸於疳積

粟米白粥等分煮粥空心食極養胃氣一人病淋性不肯服

去他味旬日或月餘症飲食珍法

調經丸治老人小兒脾泄水瀉

用松花一升百合蓮肉山藥以米芡實白茯苓各末一升粳米粉一斗二升糯米粉三升砂糖一斤拌勻蒸熟炙乾食之
[方]加砂仁末一兩

蘇葉團

治嘔病吐逆飲食不進

紫蘇葉二兩白薑薑汁各五合和勻微火煎沸每服半匙空

薑橘湯

治胸滿悶結飲食不下

用生薑二兩陳皮一兩空心水煎服

芡實粥

益精氣強智力聰耳目

田芡實去殼三合新者研如膏陳者作粉和粳米三合煮粥

蓮子粥

治同上健脾胃止泄利

蓮肉一兩去衣煮爛細研入糯米三合煮粥食

扁豆粥

益精補脾又治霍亂吐瀉

白扁豆半斤先煮豆爛去皮八人參二錢下米作粥

山藥粥

補下元固腸止瀉

懷慶山藥爲末四分配六分米煮食

茯苓粥

治脾虛泄瀉又治不寐

梗米二合茯苓末二兩煮好再下苓末二兩再煮爛食

蘿蔔粥

消食利歸

蘿蔔大者一個紀米二合煮食

胡蘿蔔粥

寬中下氣煮法同上

蘇子粥

下氣利膈

紫蘇子微炒一合研汁去查粥好下汁再煮食之

茴香粥

和胃治疝

用小茴香炒煎湯去查入米煮粥食

胡椒粥

吳茱萸湯

並治心腹疼痛 煮法同上

蓮肉糕

治病後胃弱不消水穀

蓮肉梗米各炒四兩茯苓二兩共爲末砂糖調和每用兩許白湯送下

豆麥粥

治飲食不佳口仍易飢餓近似中消

用萊豆糯米小麥各一升炒熟爲末每用末一升滾水調服

消米湯 治泄瀉

用蚕米半升東壁土一兩吳萸三錢同炒香熟去土萸取米煎湯飲。

米飲 治咽中作硬下食則塞反胃不止

用枳頭糠炒一兩煮米飲調勻空必食

黃雞餛飩 治脾胃虛弱少食痿黃益藏府悅顏色

用黃雞肉五兩白麴二兩葱白二合切作餛飩八鹹椒豉和之煮熟空心食

松子粥 潤心肺和大腸 同米煮過食

炒麴八粥同食止白痢 燒鹹八粥同食止赤痢

○氣門

杏仁粥 治上氣欬嗽

扁杏仁去皮尖二兩研如泥或加猪肺同米三合煮食

萊菔子粥 治氣喘

用萊菔子卽蘿蔔子三合煮粥食

猪腎粥 治脚氣頑痺行履不便疼痛不止

猪腎兩枚切碎葱白五莖米三合同煮臨熟加鹹豉椒調冲飲之

羊腎粥 鹿腎粥 法同治同

雞肝粥 羊肝粥 並補肝明目 煮法同上

鹿膠粥 治諸虛助元陽 煮粥入膠熔化卽是

虎骨酒 治臂脛疼痛歷節風腎虛膀胱氣痛

虎脛骨一具炙黃打碎同麴米如常造酒飲

辟瘟酒 治疝氣偏墜婦人崩中下血胎產下血

用鉄鍾火燒赤燂入酒中釀之

血門

何膠粥 止血補虛厚腸胃又治胎動不安

糯米煮粥臨熟入河膠末一兩和勻食

桑耳粥 治五痔下血常煩熱羸瘦

桑耳二兩取汁和粳米三合煮熟空心食

槐茶 治風熱下血明目益氣止牙疼利藏府順氣道

嫩槐葉蒸熟晒乾每日煎如茶

柏茶 止血滋陰

刺柏葉晒乾煎湯代茶飲

醱酒 治鼻血不止

蘿蔔自然汁入好酒一半和勻溫服

韭汁酒 治赤痢又治心痛以其散氣行血

連白韭菜一把去稍取汁和酒一杯溫服

馬齒莧羹 治下痢赤白水穀不化腹痛

馬齒莧菜煮熟入醱豉或薑醋拌勻食之

猪脰片 治肺損嗽血咯血

藕切片煮熟燕窩仁末空心服如肺癰米飲調下

羊肺肝腎 治吐血咯血損傷肺腎及肝隋藏吊用或肺或肝

或腎或熱切片蘸白芨來食○欲試血徙何經來用水二碗
吐入水中浮老肺也沉者腎也半浮半沉者肝也

痰門

蘇子酒 主消痰下氣潤肺止咳

家紫蘇子炒研細代衣或之浸酒中日日飲之

陰虛

灰質粥 且能開胃

枸杞粥 治肝家火旺益衰益腎氣

甘州枸杞一合米三合煮食 又方採鮮葉如常煮粥食八
臠少詐空腹食佳

鯽魚臠 補虛勞殺蟲治肚門腫痛痔久不愈

鰻魚細切煮作臠八臠鼓薑椒空心食

牛乳粥 補虛羸 如常粥肉加八牛乳和勻食

羊肝粥 雞肝粥 雞汁粥 並治虛勞

陽虛門

羊肉羹 治下焦虛冷小便頻數

羊肉四兩羊肝一具細切八臠鼓煮作羹空心食

胡桃粥 治湯虛腰疼及石淋五痔

胡桃肉煮粥食 又浸酒方加小茴香杜仲補骨脂

杜花酒 釀成玉色香味超然非世間物也

羊羔酒 大補元氣健脾胃益腰腎

宜和化成殿方用糯米一石如常浸將取藥再入肥嫩羊肉
七片麴十四兩杏仁一斤同煮爛連汁拌飯加八木香一兩
剉同醱勿犯水十日熟

○諸虛力

參歸腫 治心氣虛損自汗

人六五錢當歸四兩猪腎一枚細切同煮食之以汁迷下或
用之來偏丸如桐子大每服三十丸空心溫酒下多服乃佳

補腎法 治腎虛腰痛

猪腎一枚薄切五七片以椒醃瀉去腥水以杜仲末三錢在內包以薄荷外加濕紙置火內煨熟酒下如脾虛加補骨脂炒末二錢

猪腎酒 治同上

用童便二鐘好酒一鐘以磁瓶貯之取猪腎一對入內黃泥封固日晚時以湯火養熟至中夜止五更初以火溫之癸瓶飲酒食腰子病篤者只一月效平日虛怯尤宜食絕勝金石草水之藥也

猪肚方治 虛虛羸之氣

人參五錢 韓薑胡桃各二錢 葱白七 薏稗米三合 為末 入猪肚內以緊勿令泄氣 煮爛 空心服 以好酒一二杓送之
牛乳方 老人最宜 補心脉 安心神 長肌肉 為人子者 常常供之 或為乳餅 乳匳 乾諸物勝

山藥酒 補虛損 益顏色 人治下焦虛冷 小便頻數

用酥一匙 於鑊中 鎔化 人山藥末 熬令香 人酒一材 調勻 空心飲

生栗方 治脚氣及腎氣損 脚腰無力

用生栗 蒸熟 風乾 每日空心食十枚 效甚之丸 補五藏諸虛

連兩一斤云心人猶吐內專定煮燂搗丸如桐子大每三四
十九空心酒下

已上諸方其治病之功服於藥右人但知藥能治病而不知
食能治病孫真人有言曰醫者先曉病原知其所犯以食治
之食廢不愈然後議藥不特老人小兒相宜凡飢養久火病
厭藥者亦未爲不可也